

# PATIËNTENFOLDER

*Urologie | Botox behandeling blaas  
(Overactieve blaas)*

**ACIBADEM**  
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER

## Botox behandeling bij een overactieve blaas

Bij een overactieve blaas kan iemand last hebben van vaak plassen overdag en 's nachts. Er kan sprake zijn van sterke aandrang bij het plassen waarbij ook urineverlies kan optreden. In overleg met uw arts is gekozen voor een behandeling van de overactieve blaas met behulp van Botox-injecties in de blaasspier.

### Botox

Botuline-toxine (Botox) is een medicinale stof die de signaaloverdracht van de zenuwuiteinden naar de blaasspier blokkeert. Hierdoor ontstaat een afname in de contractiekracht (samentrekking) van de blaas. Dit heeft als gevolg dat minder (vaak) een aandranggevoel wordt ervaren. Ook neemt de frequentie van het plassen af. De werking van Botox is 6 tot 12 maanden. Het toedienen van de injecties kan worden herhaald.

### De ingreep

De toediening van de Botox-injecties vindt plaats op de operatiekamer. Omdat het injecteren van de Botox in de blaasspier pijnlijk kan zijn, wordt de toediening verricht via een ruggenprik (spinale anesthesie), lokale verdoving of algehele narcose. De uroloog brengt via de plasbuis een buisje (cystoscoop) in uw blaas. De blaas wordt via het buisje gevuld met water zodat de wand goed te zien is. Met behulp van een lens in het buisje kan de uroloog goed in de blaas kijken. De uroloog brengt via een zijkanaal van het buisje een dunne naald in de blaas om mee in de blaasspier te kunnen prikken. Op verschillende plekken wordt Botox ingespoten. In totaal duurt de behandeling ongeveer 20 minuten.

### Na de ingreep

Tijdens de behandeling heeft u in uw hand of arm een infuus om wat extra vocht toe te kunnen dienen. Het infuus zal worden verwijderd als u voldoende eet en drinkt. Ook kan de uroloog na de behandeling een blaaskatheter achtergelaten in de blaas. Via de blaaskatheter kan de urine uit de blaas lopen en hoeft u niet te plassen. De blaaskatheter wordt in principe de volgende ochtend weer verwijderd. Na de behandeling gaat u naar huis. De volgende ochtend wordt bij een polibezoek de katheter verwijderd en mag u zelf weer plassen. Er wordt dan met een echo apparaat gecontroleerd of de blaas voldoende leeg komt. Is dit het geval dan mag u weer naar huis. Als er te veel urine achterblijft in de blaas zal meestal kortdurend worden gestart met zelfkatheterisatie.

### Wat kunt u thuis verwachten

In de eerste dagen na de behandeling kan er nog wat bloed in de urine zitten. Om te voorkomen dat het bloed in de blaas gaat stollen, is het belangrijk dat u ongeveer 2 liter vocht op een dag drinkt. De positieve effecten van de behandeling treden meestal na zo'n drie dagen op.

### Wanneer neemt u contact op

Neemt u tot de eerste poliklinische controle eerder contact op als de volgende klachten ontstaan:

- Als plotselinge hevige of aanhoudende buikpijn, die met 4 keer daags twee tabletten paracetamol van 500 mg niet verdwijnt;
- Bij hevig bloedverlies en het plassen van grote bloedstolsels;
- Als het plassen niet (meer) lukt of u het gevoel heeft niet goed te kunnen uitplassen;
- Als er kort na de ingreep langer dan 24 uur koorts van boven de 38,5 graden ontstaat.

## FINANCIËLE ASPECTEN

Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%-0% voor u. U betaalt dus niets extra's.

Ons privacyreglement vindt u op <http://www.acibademimc.com/over-ons> onder Privacy & klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/of claims;

Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

## Vragen of suggesties?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

Wat ik nog wil weten:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Versie: januari 2019

**ACIBADEM**  
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER